

# Contrôle des rongeurs



A Hendrix Genetics Company

[info.hybrid@hendrix-genetics.com](mailto:info.hybrid@hendrix-genetics.com)

[www.hybridturkeys.com](http://www.hybridturkeys.com)

Chaque automne, les vétérinaires, responsables de lots, éleveurs et exploitants recevront des rappels concernant le contrôle des rongeurs. Pour de nombreux exploitants et éleveurs, le contrôle des rongeurs se situe plutôt en bas d'une liste interminable de tâches à effectuer. Par conséquent, soit le contrôle des rongeurs est effectué de manière occasionnelle, soit le programme consiste à jeter quelques paquets d'appât sur le sol du sas d'entrée. Ce programme est généralement considéré comme réussi si le lot n'attrape pas le choléra et si les rongeurs n'envahissent pas l'exploitation. Outre le fait qu'ils introduisent des maladies dans le lot, les rongeurs consomment et contaminent les aliments, et rongent les composants électriques, mécaniques, structurels et autres des installations. Il est difficile d'évaluer précisément le coût réel des dommages infligés par les rongeurs à un élevage de dindes. Par conséquent, lorsque la conversion alimentaire n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être et que les coûts de chauffage sont plus élevés, peu de gens pensent que le problème pourrait être lié aux rongeurs.

L'hiver est l'une des périodes les plus stratégiques pour l'éradication de rongeurs et ce, pour deux raisons. Premièrement, c'est à cette époque de l'année que les rongeurs sont moins nombreux. Les études montrent que moins de 50 souris vivant sur une exploitation peuvent se multiplier pour atteindre plus de 2 000 souris en 6 mois seulement. Réduire leur nombre permettra d'éviter une telle explosion démographique. Deuxièmement, par temps froid, les rongeurs sont plus susceptibles de consommer des appâts, les autres sources de nourriture comme les céréales dans les champs n'étant plus disponibles.

### Les étapes suivantes sont cruciales dans un programme de contrôle des rongeurs :

#### 1<sup>re</sup> étape

**Éliminez les raisons (aliments, eau, sites de nidification) pour lesquelles les rongeurs sont attirés par votre exploitation.**

Ne les accueillez pas à bras ouverts. Nettoyez rapidement les débordements d'aliments autour des conteneurs. Éliminez tous les débris extérieurs, du type vieux matériel, planches, tuyaux, etc., dans lesquels les rongeurs peuvent se cacher ou nidifier. Désherbez pour dégager un périmètre de 3 pieds (1 m) autour de chaque bâtiment.

#### 2<sup>e</sup> étape

**Empêchez les rongeurs d'accéder aux bâtiments.**

Il est impératif d'avoir un bâtiment bien construit. Les souris peuvent se glisser dans un trou de 18 mm et les rats dans un trou de 24 mm. Il est important de surveiller spécifiquement vos aménagements pour déceler toute trace d'activité de rongeurs et identifier les zones par lesquelles ils pourraient pénétrer. Si vous ne cherchez rien, vous ne trouverez rien. Les extrémités latérales en tôle ondulée des bâtiments constituent souvent un point d'entrée pour les souris. Les portes doivent se fermer hermétiquement ou bien être dotées de bandes-brosses ou autres bandes anti-nuisibles. Bouchez les ouvertures autour des vis, tuyaux et câbles avec du ciment, du mortier ou des colliers métalliques.

#### 3<sup>e</sup> étape

**Réduisez le nombre de rongeurs par la pose de pièges ou d'appâts empoisonnés**

Réduisez le nombre de rongeurs par la pose de pièges ou d'appâts empoisonnés. Pour cela, il est indispensable de bien choisir et de placer correctement les postes d'appâtage et les appâts. Il existe plusieurs types et formes d'appâts. Il est préférable d'utiliser du poison en uni-doses. Le poison le plus indiqué est celui que les rongeurs présents dans votre exploitation préfèrent. Pour l'identifier, choisissez une zone présentant une forte activité de rongeurs et laissez plusieurs types d'appâts sur un morceau de carton dans un endroit abrité (par ex. derrière une planche de bois appuyée contre un mur). Quelques jours plus tard, vérifiez quel(s) poison(s) vos rongeurs ont préféré(s) et utilisez-le(s) pour appâter la totalité de l'exploitation. Certains types d'appâts comme les blocs de cire sont utiles dans les endroits humides ou difficiles d'accès comme les greniers. Ne stockez pas les appâts avec d'autres produits chimiques et ne les manipulez pas à mains nues, étant donné qu'ils risquent d'absorber les odeurs, ce qui diminuerait leur efficacité. Lisez et suivez attentivement les instructions apposées sur tous les rodenticides, qui sont toxiques, et manipulez-les en conséquence.

**L'utilisation de postes d'appâtage ou de boîtes à poison est très importante pour les raisons suivantes :**

- Les conteneurs conservent la fraîcheur des appâts et diminuent le gaspillage. Les rongeurs ne consommeront pas des appâts humides ou moisis.

## CONTRÔLE DES RONGEURS

- Les conteneurs vous permettent en outre de surveiller la consommation des appâts.
- Les rongeurs aiment manger dans des endroits abrités.
- Les conteneurs réduisent le risque d'empoisonnement accidentel d'enfants ou d'animaux domestiques.

Les conteneurs réduisent le risque d'empoisonnement accidentel d'enfants ou d'animaux domestiques.

De nombreux types de postes d'appâtage sont disponibles dans le commerce, y compris des boîtes inviolables. Des conteneurs « faits maison » peuvent être fabriqués avec des tubes de métal ou de PVC de 12 – 24 pouces (30,5 – 61 cm) de long, des caisses en bois ou des grandes boîtes de conserve. Les conteneurs doivent être suffisamment spacieux pour contenir plusieurs rongeurs en même temps et doivent disposer au minimum de deux ouvertures de la taille d'un rongeur : 1,5 pouce (3,8 cm) pour les souris et 2,5 pouces (6,4 cm) pour les rats. Les postes d'appâtage doivent être vérifiés chaque semaine au début d'un programme de contrôle des rongeurs ou dans les cas de forte invasion. Remplacez les appâts uniquement dans les endroits et/ou conteneurs où ils ont été entièrement consommés. Une fois le contrôle des rongeurs effectué, vérifiez et réapprovisionnez les appâts intérieurs toutes les 2 semaines. Pour les invasions de moindre importance, les appâts peuvent être placés uniquement dans les endroits où les rongeurs sont actifs, persistants ou susceptibles de pénétrer.

Les appâts doivent être placés au sein de l'exploitation dans les endroits stratégiques où les rongeurs les trouveront. N'oubliez pas que les souris mangent de façon sporadique et sont constamment sur le qui-vive. Elles se nourrissent dans de nombreux endroits chaque soir, en grignotant de minuscules quantités d'aliments ici et là. Beaucoup de gens n'appâtent pas suffisamment dans le cadre de leur programme de contrôle des rongeurs. Les appâts devraient être disposés tous les 2, 4 – 3 m pour les souris et tous les 7, 6 – 15 m pour les rats dans les endroits présentant des signes d'activité. Cela comprend notamment les greniers que les rongeurs utilisent souvent pendant les mois plus froids. Les greniers doivent être appâtés, sinon les rongeurs qui vivent dans les niveaux supérieurs viendront constamment remplacer les rongeurs éliminés par votre programme de contrôle des rongeurs au niveau inférieur. Les appâts doivent être placés des deux côtés de la poutre centrale. Il est également important d'installer des postes d'appâtage permanents sur la périphérie extérieure du poulailler. Ils doivent être placés

de chaque côté de chaque porte ou ouverture du bâtiment susceptible de laisser les rongeurs venant des champs environnants pénétrer dans le poulailler. Remplacez les appâts extérieurs toutes les 4-6 semaines ou plus souvent s'ils deviennent humides ou rances.

**En conclusion, pour un contrôle des rongeurs efficace, vous devez :**

- Savoir précisément ce qui vous attend (c.-à-d. vos points faibles et les points forts de vos adversaires).
- Évaluer l'exploitation en termes de nombre de rongeurs, d'intégrité structurelle des poulaillers, de points d'accès des rongeurs et des raisons qui les attirent en premier lieu vers votre exploitation.
- Mettre tous les bâtiments hors d'atteinte des rongeurs et éliminer les endroits pouvant servir d'abri ou favorables à la nidification autour des poulaillers.
- Identifier le(s) type(s) d'appâts les mieux adaptés pour les rongeurs présents sur votre exploitation et les utiliser à des endroits stratégiques, dans des postes d'appâtage adaptés. Ne pas sous-appâter.
- Surveiller les postes d'appâtage. Réapprovisionner selon les besoins. Consigner l'activité pour chaque poste.

Enfin, l'aspect le plus important d'un programme de contrôle des rongeurs efficace consiste à en faire une priorité sur l'exploitation : pas uniquement quand vous voyez des rongeurs, mais TOUT le temps.

### © Hybrid Turkeys

Les informations ci-incluses ne sont communiquées qu'à titre de recommandations et peuvent différer selon la zone géographique. Cette fiche d'information a pour objet d'apporter une aide en vue d'une amélioration de la production de dinde.

Sauf stipulation contraire, les informations fournies dans ce document sont la propriété exclusive d'Hybrid Turkeys. Veuillez vous procurer les autorisations nécessaires avant toute reproduction de ces documents en contactant Hybrid Turkeys.

[info.hybrid@hendrix-genetics.com](mailto:info.hybrid@hendrix-genetics.com)  
[www.hybridturkeys.com](http://www.hybridturkeys.com)