



Советы по температурному режиму

Подращивание в рингах		
	Самка	Самец
	°C	°C
Неделя 1	29–30	29–30
Неделя 2	27,8	27,8
Неделя 3	26,6	26,6
Неделя 4	25,5	25,5
Неделя 5	22,8	22,8
Неделя 6	21,1	21,1
Неделя 7	20,0	18,9
Неделя 8	18,9	17,8
Неделя 9	18,3	17,2
Неделя 10	18,3	16,7
Неделя 11	18,3	16,7
Неделя 12	17,8	16,7
Неделя 13	17,8	15,5
Неделя 14	17,8	15,5
Неделя 15 и далее	16,7	14,4

Подращивание по всему корпусу		
	Самка	Самец
	°C	°C
Неделя 1	31–33	31–33
Неделя 2	28,9	28,9
Неделя 3	27,8	27,8
Неделя 4	25,5	25,5
Неделя 5	23,3	23,3
Неделя 6	21,1	21,1
Неделя 7	20	19,4
Неделя 8	18,9	17,8
Неделя 9	18,3	17,2
Неделя 10	18,3	16,7
Неделя 11	18,3	16,7
Неделя 12	17,8	16,7
Неделя 13	17,8	15,5
Неделя 14	17,8	15,5
Неделя 15 и далее	16,7	14,4

Примечание. По достижении возраста 5 (пяти) недель допустимо отклонение температуры в пределах $\pm 1,7$ °C (± 3 °F). В условиях экстремального холода может быть сложно поддерживать такие уровни температуры. Для птиц всех возрастов необходимая температура для вскармливания определяется их комфортом.

Настоящий документ предназначен для использования в справочных целях и пополнения имеющихся знаний о птицеводстве. Чтобы подробнее узнать об указанных руководствах и получить дополнительные сведения по другим вопросам управления, посетите веб-сайт resources.hybridturkeys.com или свяжитесь с нашей командой технических специалистов по адресу hybrid.tech@hendrix-genetics.com.