

Odchów

Sukces stada zależy od zdrowego początku życia piskląt. Poniżej opisanych jest pięć kluczowych obszarów stanowiących fundament jednorodnego stada, w którym zwierzęta czują się komfortowo i są gotowe do realizacji swojego pełnego potencjału genetycznego.

Cel: Aktywne pisklęta, skupione na jedzeniu i piciu. Test wola: > 90% wypełnione wole dzień po wstawieniu



Zalecenia dotyczące temperatury

- Ogrzanie indycznika na 24-96 godzin przed wstawieniem
- Zakres temperatury:
 - Odchów w kęgach: 29-30°C
 - Odchów na całej powierzchni: 31-33°C



Monitorowanie jakości powietrza

- CO₂: < 2500 ppm
- CO: < 25 ppm
- Wilgotność względna: < 60%



Dostęp do czystej wody

- Poziom ORP > 700 mV (w przypadku chloru i zakwaszania stosowanych w procesie sanitacji)
- Utrzymywanie poziomu pH między 5,5 a 6,5
- 80 ptaków na jedno poidło dzwonne



Dostęp do paszy

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami żywieniowymi Hybrid Turkeys.
- Ptaki powinny mieć dostęp do paszy odpowiadający 2,54 cm na ptaka.
- Podczas odchowu zalecane są dodatkowe karmidła.



Odpowiednie oświetlenie

- Co najmniej 60 luksów.
- Dzień 1: Oświetlenie przez 24 godziny na dobę.
- Dzień 2-7: Należy skracać czas oświetlenia o 1 godzinę dziennie, aż ekspozycja na światło spadnie do 18 godzin dziennie.

Ta karta informacyjna stanowi jedynie materiał referencyjny i uzupełnienie własnych umiejętności w zakresie zarządzania hodowlą. Dodatkowe informacje dotyczące każdego z podstawowych obszarów hodowli można znaleźć na stronie

resources.hybridturkeys.com lub otrzymać od naszego zespołu technicznego pod adresem hybrid.tech@hendrix-genetics.com