



Guías de temperatura

Anillo de crecimiento		
	Hembra	Macho
	°C	°C
Semana 1	29-30	29-30
Semana 2	27,8	27,8
Semana 3	26,6	26,6
Semana 4	25,5	25,5
Semana 5	22,8	22,8
Semana 6	21,1	21,1
Semana 7	20,0	18,9
Semana 8	18,9	17,8
Semana 9	18,3	17,2
Semana 10	18,3	16,7
Semana 11	18,3	16,7
Semana 12	17,8	16,7
Semana 13	17,8	15,5
Semana 14	17,8	15,5
Semana 15 y posteriores	16,7	14,4

Cuarto de crecimiento completo		
	Hembra	Macho
	°C	°C
Semana 1	31-33	31-33
Semana 2	28,9	28,9
Semana 3	27,8	27,8
Semana 4	25,5	25,5
Semana 5	23,3	23,3
Semana 6	21,1	21,1
Semana 7	20	19,4
Semana 8	18,9	17,8
Semana 9	18,3	17,2
Semana 10	18,3	16,7
Semana 11	18,3	16,7
Semana 12	17,8	16,7
Semana 13	17,8	15,5
Semana 14	17,8	15,5
Semana 15 y posteriores	16,7	14,4

Nota: Después de transcurrir cinco (5) semanas de vida, las temperaturas se pueden desviar a + o - 1,7°C (3°F). En situaciones de frío extremo, puede resultar difícil mantener esas temperaturas. La comodidad de las aves dicta cuál es la temperatura adecuada para la crianza a todas las edades.

Esta hoja sirve como referencia y complementa los conocimientos acerca de la gestión de camadas. Para obtener información adicional acerca de las pautas que se listan aquí, así como para consultar otros temas de gestión, visite resources.hybridturkeys.com o póngase en contacto con nuestro equipo técnico a at hybrid.tech@hendrix-genetics.com