

Alter (Wochen)	Körpergewicht (KG)	Gewichts-Zunahme (KG)	Kumulativer Futtermittelverbrauch (KG)	Wochenverbrauch Futter (KG)
1	0,19			0,15
2	0,38	0,18	0,47	0,31
3	0,73	0,35	1,26	0,79
4	1,24	0,50	2,41	1,15
5	1,90	0,66	3,73	1,31
6	2,70	0,79	5,41	1,68
7	3,62	0,92	7,34	1,92
8	4,65	1,03	9,55	2,20
9	5,79	1,13	11,97	2,42
10	7,00	1,21	14,69	2,71
11	8,29	1,28	17,67	2,98
12	9,62	1,33	20,85	3,17
13	10,98	1,35	24,19	3,34
14	12,36	1,37	27,73	3,54
15	13,74	1,38	31,47	3,73
16	15,11	1,36	35,39	3,92
17	16,46	1,35	39,48	4,08
18	17,80	1,33	43,73	4,25
19	19,11	1,31	48,12	4,38
20	19,61	0,49	52,60	4,47
21	20,11	0,49	57,16	4,56
22	20,59	0,48	61,82	4,65
23	21,09	0,49	66,57	4,74
24	21,59	0,49	71,41	4,83
25	22,08	0,49	76,34	4,92
26	22,53	0,44	81,36	5,01
27	22,97	0,44	86,47	5,10
28	23,42	0,44	91,67	5,19
29	23,85	0,43	96,96	5,28
30	24,26	0,40	102,34	5,37

Diese Ziele basieren auf Ergebnissen, die unter Anrechnung geringer Sterblichkeit sowie auf Grundlage der Hybrid-Fütterungsempfehlungen erzielt wurden. Grundsätzlich werden die Ergebnisse durch das Fütterungsprogramm, die Wasserqualität, Umwelteinflüsse, die Herdengesundheit und die Besatzdichte beeinflusst. Zulässige Abweichung von Körpergewicht-Zielwerten in %: 0-8 Wochen: 1,25 % unter Ziel bis 2,5 % über Ziel; 9-20 Wochen: 2 % unter Ziel bis 3,75 % über Ziel; 21-30 Wochen: 2,5 % unter Ziel bis 5 % über Ziel. Von den altersabhängigen Futtermittelverbrauchs-Zielwerten ist eine Abweichung von ± 5 % zulässig.